

Session :	Septembre 2018
Année d'étude :	Première année de Master économique-gestion Mention économie managériale et industrielle
Discipline :	<i>Économétrie appliquée</i> (Unité d'Enseignements Fondamentaux 1)
Titulaire(s) du cours :	M. Alain PIROTTE
Document(s) autorisé(s) :	Aucun Calculatrice <u>non programmable</u> autorisée
Durée de l'épreuve :	3 heures

Questions

1. Quelle est l'utilité de la méthode d'*Almon* ?
2. Dans un modèle à retards échelonnés infinis, l'approche par troncature est-elle incontournable ?
3. Énoncer le(s) principe(s) de l'estimateur par variables instrumentales généralisées.

Exercice n°1

On se propose d'analyser la relation entre les salaires des patrons des 100 plus grandes entreprises néerlandaises et les profits dégagés en 1999 à partir du modèle

$$\ln s_i = b_0 + b_1 \ln pro_i + \varepsilon_i, \quad (1)$$

où s_i désigne le salaire annuel moyen (en milliers de florins néerlandais¹) du patron de l'entreprise i , et pro_i , le profit (en milliers de florins néerlandais) de l'entreprise i . ε_i est la perturbation d'espérance nulle et supposée homoscedastique. \ln correspond au logarithme népérien.

1. L'application des MCO a donné les résultats suivants²:

$$\widehat{\ln s_i} = 6,350 + 0,162 \ln pro_i, \quad (2)$$

(0,129) (0,022)

$$R^2 = 0,366.$$

Quels commentaires inspirent-ils ? Quelles sont les propriétés d'une telle estimation ?

2. Est-il pertinent de s'interroger sur l'exogénéité du profit ?
3. En supposant que l'on dispose du chiffre d'affaires de chaque entreprise i , noté ca_i , la méthode par variables instrumentales a donné les résultats

$$\widehat{\ln s_i} = 6,253 + 0,181 \ln pro_i, \quad (3)$$

(0,183) (0,032)

$$R^2 = 0,386.$$

Quels commentaires inspirent-ils ?

4. Est-il pertinent de retenir ca_i comme instrument ? Comment faire pour tester l'exogénéité de ca_i ?

¹En 1999, l'euro n'était pas encore entré en vigueur.

²Tout au long de cet exercice, les nombres entre parenthèses en dessous des coefficients estimés correspondent aux écarts-types estimés.

Exercice n°2

Soit le modèle à équations simultanées :

$$\begin{cases} y_{1t} = a_1 + a_2 y_{2t} + a_3 y_{3t} + a_4 x_{1t} + u_{1t} \\ y_{2t} = b_1 + b_2 y_{1t} + b_3 x_{1t} + b_4 x_{2t} + b_5 x_{3t} + u_{2t} \\ y_{3t} = c_1 + c_2 y_{2t} + c_3 x_{1t} + c_4 x_{2t} + c_5 x_{3t} + c_6 x_{4t} + u_{3t} \end{cases} \quad (4)$$

où $t = 1, \dots, T$, u_{1t} , u_{2t} et u_{3t} sont supposés corrélés.

1. Identifier la nature des variables y_{1t} , y_{2t} , y_{3t} , x_{1t} , x_{2t} , x_{3t} et x_{4t} .
2. Écrire matriciellement les formes structurelle et réduite.
3. Étudier les conditions d'identification de chaque équation. Commenter.
4. Est-il pertinent de recourir à l'estimateur des Doubles Moindres Carrés (DMC) pour estimer les paramètres des deux équations ?
5. Les Triples Moindres Carrés (TMC) sont-ils préférables aux DMC ?

Exercice n°3

Soit le modèle SURE à trois équations :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \mathbf{y}_1 \\ \mathbf{y}_2 \\ \mathbf{y}_3 \end{pmatrix}}_{\mathbf{y}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \mathbf{X}_1 & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{X}_2 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{X}_3 \end{pmatrix}}_{\mathbf{X}} \underbrace{\begin{pmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \mathbf{b}_3 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}} + \underbrace{\begin{pmatrix} \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{u}_2 \\ \mathbf{u}_3 \end{pmatrix}}_{\mathbf{u}} \quad (5)$$


où \mathbf{y}_j est le vecteur de la variable expliquée de l'équation j de taille $(T, 1)$, \mathbf{X}_j , la matrice des variables explicatives de l'équation j de dimension $(T, k + 1)$, \mathbf{b}_j , le vecteur des paramètres à estimer de l'équation j de dimension $(k + 1, 1)$ et \mathbf{u}_j , le vecteur des perturbations de l'équation j de dimension $(T, 1)$. On a également :

$$E[\mathbf{u}] = \mathbf{0} \quad (6)$$

$$V[\mathbf{u}] = \mathbf{\Omega} = \begin{pmatrix} \sigma_{11}\mathbf{I}_T & \sigma_{12}\mathbf{I}_T & \sigma_{13}\mathbf{I}_T \\ \sigma_{21}\mathbf{I}_T & \sigma_{22}\mathbf{I}_T & \sigma_{23}\mathbf{I}_T \\ \sigma_{31}\mathbf{I}_T & \sigma_{32}\mathbf{I}_T & \sigma_{33}\mathbf{I}_T \end{pmatrix} \quad (7)$$

1. Donner l'expression de l'estimateur de \mathbf{b} . Cet estimateur est-il sans biais ?
2. Donner l'expression de sa matrice de variances-covariances.
3. Illustrer la pertinence ce type de modélisation à l'aide de deux exemples économiques.

Variable de STUDENT à ν degrés de liberté



$T_\nu = \frac{U}{\sqrt{Y/\nu}}$ où $U \approx N(0,1)$ et $Y \approx \chi^2(\nu)$ sont indépendants en probabilité.


TABLE de t en fonction du degré de liberté ν et de la probabilité p, tels que $P(|T_\nu| > t) = p$:

ν	P	0,90	0,70	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
1		0,158	0,510	1,000	1,376	1,963	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2		0,142	0,445	0,816	1,061	1,386	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3		0,137	0,424	0,765	0,978	1,250	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4		0,134	0,414	0,741	0,941	1,190	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5		0,132	0,408	0,727	0,920	1,156	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6		0,131	0,404	0,718	0,906	1,134	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7		0,130	0,402	0,711	0,896	1,119	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8		0,130	0,399	0,706	0,889	1,108	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9		0,129	0,398	0,703	0,883	1,100	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10		0,129	0,397	0,700	0,879	1,093	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11		0,129	0,396	0,697	0,876	1,088	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12		0,128	0,395	0,695	0,873	1,083	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13		0,128	0,394	0,694	0,870	1,079	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14		0,128	0,393	0,692	0,868	1,076	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15		0,128	0,393	0,691	0,866	1,074	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16		0,128	0,392	0,690	0,865	1,071	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17		0,128	0,392	0,689	0,863	1,069	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18		0,127	0,392	0,688	0,862	1,067	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878
19		0,127	0,391	0,688	0,861	1,066	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20		0,127	0,391	0,687	0,860	1,064	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21		0,127	0,391	0,686	0,859	1,063	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22		0,127	0,390	0,686	0,858	1,061	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819
23		0,127	0,390	0,685	0,858	1,060	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807
24		0,127	0,390	0,685	0,857	1,059	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797
25		0,127	0,390	0,684	0,856	1,058	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787
26		0,127	0,390	0,684	0,856	1,058	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779
27		0,127	0,389	0,684	0,855	1,057	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771
28		0,127	0,389	0,683	0,855	1,056	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763
29		0,127	0,389	0,683	0,854	1,055	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756
30		0,127	0,389	0,683	0,854	1,055	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750
		0,12566	0,38532	0,67449	0,84162	1,03643	1,28155	1,64485	1,95996	2,32634	2,57582

La loi limite, lorsque ν tend vers l'infini, est une loi Normale centrée réduite.

LOI NORMALE $\mathcal{N}(0, 1)$

Fonction de répartition de la loi Normale. — La fonction de répartition Φ de la loi Normale $\mathcal{N}(0, 1)$ est définie par $\Phi(z) = \int_{-\infty}^z e^{-u^2/2} du/\sqrt{2\pi}$, $z \in \mathbb{R}$. Pour tout $z \in \mathbb{R}$, on a $\Phi(z) = 1 - \Phi(-z)$.



z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986

Exemples. — $\Phi(0,25) \approx 0,5987$, $\Phi(-0,32) = 1 - \Phi(0,32) \approx 1 - 0,6255 = 0,3745$.

Test de Durbin et Watson

Test unilatéral de $\rho = 0$ contre $\rho > 0$

(Valeurs critiques d_L^* et d_U^* pour un risque de première espèce $\alpha = 5\%$)

n	k = 1		k = 2		k = 3		k = 4		k = 5	
	d_L	d_U								
15	1,08	1,36	0,95	1,54	0,82	1,75	0,69	1,97	0,56	2,21
16	1,10	1,37	0,98	1,54	0,86	1,73	0,74	1,93	0,62	2,15
17	1,13	1,38	1,02	1,54	0,90	1,71	0,78	1,90	0,67	2,10
18	1,16	1,39	1,05	1,53	0,93	1,69	0,82	1,87	0,71	2,06
19	1,18	1,40	1,08	1,53	0,97	1,68	0,86	1,85	0,75	2,02
20	1,20	1,41	1,10	1,54	1,00	1,68	0,90	1,83	0,79	1,99
21	1,22	1,42	1,13	1,54	1,03	1,67	0,93	1,81	0,83	1,96
22	1,24	1,43	1,15	1,54	1,05	1,66	0,96	1,80	0,86	1,94
23	1,26	1,44	1,17	1,54	1,08	1,66	0,99	1,79	0,90	1,92
24	1,27	1,45	1,19	1,55	1,10	1,66	1,01	1,78	0,93	1,90
25	1,29	1,45	1,21	1,55	1,12	1,66	1,04	1,77	0,95	1,89
26	1,30	1,46	1,22	1,55	1,14	1,65	1,06	1,76	0,98	1,88
27	1,32	1,47	1,24	1,56	1,16	1,65	1,08	1,76	1,01	1,86
28	1,33	1,48	1,26	1,56	1,18	1,65	1,10	1,75	1,03	1,85
29	1,34	1,48	1,27	1,56	1,20	1,65	1,12	1,74	1,05	1,84
30	1,35	1,49	1,28	1,57	1,21	1,65	1,14	1,74	1,07	1,83
31	1,36	1,50	1,30	1,57	1,23	1,65	1,16	1,74	1,09	1,83
32	1,37	1,50	1,31	1,57	1,24	1,65	1,18	1,73	1,11	1,82
33	1,38	1,51	1,32	1,58	1,26	1,65	1,19	1,73	1,13	1,81
34	1,39	1,51	1,33	1,58	1,27	1,65	1,21	1,73	1,15	1,81
35	1,40	1,52	1,34	1,58	1,28	1,65	1,22	1,73	1,16	1,80
36	1,41	1,52	1,35	1,59	1,29	1,65	1,24	1,73	1,18	1,80
37	1,42	1,53	1,36	1,59	1,31	1,66	1,25	1,72	1,19	1,80
38	1,43	1,54	1,37	1,59	1,32	1,66	1,26	1,72	1,21	1,79
39	1,43	1,54	1,38	1,60	1,33	1,66	1,27	1,72	1,22	1,79
40	1,44	1,54	1,39	1,60	1,34	1,66	1,29	1,72	1,23	1,79
45	1,48	1,57	1,43	1,62	1,38	1,67	1,34	1,72	1,29	1,78
50	1,50	1,59	1,46	1,63	1,42	1,67	1,38	1,72	1,34	1,77
55	1,53	1,60	1,49	1,64	1,45	1,68	1,41	1,72	1,38	1,77
60	1,55	1,62	1,51	1,65	1,48	1,69	1,44	1,73	1,41	1,77
65	1,57	1,63	1,54	1,66	1,50	1,70	1,47	1,73	1,44	1,77
70	1,58	1,64	1,55	1,67	1,52	1,70	1,49	1,74	1,46	1,77
75	1,60	1,65	1,57	1,68	1,54	1,71	1,51	1,74	1,49	1,77
80	1,61	1,66	1,59	1,69	1,56	1,72	1,53	1,74	1,51	1,77
85	1,62	1,67	1,60	1,70	1,57	1,72	1,55	1,75	1,52	1,77
90	1,63	1,68	1,61	1,70	1,59	1,73	1,57	1,75	1,54	1,78
95	1,64	1,69	1,62	1,71	1,60	1,73	1,58	1,75	1,56	1,78
100	1,65	1,69	1,63	1,72	1,61	1,74	1,59	1,76	1,57	1,78


(n : nombre d'observations ; k : nombre de variables explicatives autres que la constante)

LOI DE FISHER-SNEDECOR ($\alpha = 0,05$)

Si F est une variable aléatoire suivant la loi de Fisher-Snedecor à (ν_1, ν_2) degrés de liberté, la table donne la valeur $f_{1-\alpha}$ telle que

$$\mathbb{P}\{F \geq f_{1-\alpha}\} = \alpha = 0,05.$$

Ainsi, $f_{1-\alpha}$ est le quantile d'ordre $1 - \alpha = 0,95$ de la loi de Fisher-Snedecor à (ν_1, ν_2) degrés de liberté.



$\nu_2 \backslash \nu_1$	1	2	3	4	5	6	8	10	15	20	30	∞
1	161	200	216	225	230	234	239	242	246	248	250	254
2	18,5	19,0	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5
3	10,1	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,85	8,79	8,70	8,66	8,62	8,53
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,04	5,96	5,86	5,80	5,75	5,63
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,82	4,74	4,62	4,56	4,50	4,36
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,15	4,06	3,94	3,87	3,81	3,67
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,73	3,64	3,51	3,44	3,38	3,23
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,44	3,35	3,22	3,15	3,08	2,93
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,23	3,14	3,01	2,94	2,86	2,71
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,07	2,98	2,85	2,77	2,70	2,54
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	2,95	2,85	2,72	2,65	2,57	2,40
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,85	2,75	2,62	2,54	2,47	2,30
13	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,77	2,67	2,53	2,46	2,38	2,21
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,70	2,60	2,46	2,39	2,31	2,13
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,64	2,54	2,40	2,33	2,25	2,07
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,59	2,49	2,35	2,28	2,19	2,01
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,55	2,45	2,31	2,23	2,15	1,96
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,51	2,41	2,27	2,19	2,11	1,92
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,48	2,38	2,23	2,16	2,07	1,88
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,45	2,35	2,20	2,12	2,04	1,84
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,40	2,30	2,15	2,07	1,98	1,78
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,36	2,25	2,11	2,03	1,94	1,73
26	4,23	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,32	2,22	2,07	1,99	1,90	1,69
28	4,20	3,34	2,95	2,71	2,56	2,45	2,29	2,19	2,04	1,96	1,87	1,65
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,27	2,16	2,01	1,93	1,84	1,62
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,18	2,08	1,92	1,84	1,74	1,51
50	4,03	3,18	2,79	2,56	2,40	2,29	2,13	2,03	1,87	1,78	1,69	1,44
60	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,10	1,99	1,84	1,75	1,65	1,39
80	3,96	3,11	2,72	2,49	2,33	2,21	2,06	1,95	1,79	1,70	1,60	1,32
100	3,94	3,09	2,70	2,46	2,31	2,19	2,03	1,93	1,77	1,68	1,57	1,28
∞	3,84	3,00	2,60	2,37	2,21	2,10	1,94	1,83	1,67	1,57	1,46	1,00

TABLE DU CHI-DEUX : $\chi^2(n)$



n	P	0.90	0.80	0.70	0.50	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01
1		0,0158	0,0642	0,148	0,455	1,074	1,642	2,706	3,841	5,412	6,635
2		0,211	0,446	0,713	1,386	2,408	3,219	4,605	5,991	7,824	9,210
3		0,584	1,005	1,424	2,366	3,665	4,642	6,251	7,815	9,837	11,341
4		1,064	1,649	2,195	3,357	4,878	5,989	7,779	9,488	11,668	13,277
5		1,610	2,343	3,000	4,351	6,064	7,289	9,236	11,070	13,388	15,086
6		2,204	3,070	3,828	5,348	7,231	8,558	10,645	12,592	15,033	16,812
7		2,833	3,822	4,671	6,346	8,383	9,803	12,017	14,067	16,622	18,475
8		3,490	4,594	5,527	7,344	9,524	11,030	13,362	15,507	18,168	20,090
9		4,168	5,380	6,393	8,343	10,656	12,242	14,684	16,919	19,679	21,666
10		4,865	6,179	7,267	9,342	11,781	13,442	15,987	18,307	21,161	23,209
11		5,578	6,989	8,148	10,341	12,899	14,631	17,275	19,675	22,618	24,725
12		6,304	7,807	9,034	11,340	14,011	15,812	18,549	21,026	24,054	26,217
13		7,042	8,634	9,926	12,340	15,119	16,985	19,812	22,362	25,472	27,688
14		7,790	9,467	10,821	13,339	16,222	18,151	21,064	23,685	26,873	29,141
15		8,547	10,307	11,721	14,339	17,322	19,311	22,307	24,996	28,259	30,578
16		9,312	11,152	12,624	15,338	18,418	20,465	23,542	26,296	29,633	32,000
17		10,085	12,002	13,531	16,338	19,511	21,615	24,769	27,587	30,995	33,409
18		10,865	12,857	14,440	17,338	20,601	22,760	25,989	28,869	32,346	34,805
19		11,651	13,716	15,352	18,338	21,689	23,900	27,204	30,144	33,687	36,191
20		12,443	14,578	16,266	19,337	22,775	25,038	28,412	31,410	35,020	37,566
21		13,240	15,445	17,182	20,337	23,858	26,171	29,615	32,671	36,343	38,932
22		14,041	16,314	18,101	21,337	24,939	27,301	30,813	33,924	37,659	40,289
23		14,848	17,187	19,021	22,337	26,018	28,429	32,007	35,172	38,968	41,638
24		15,659	18,062	19,943	23,337	27,096	29,553	33,196	36,415	40,270	42,980
25		16,473	18,940	20,867	24,337	28,172	30,675	34,382	37,652	41,566	44,314
26		17,292	19,820	21,792	25,336	29,246	31,795	35,563	38,885	42,856	45,642
27		18,114	20,703	22,719	26,336	30,319	32,912	36,741	40,113	44,140	46,963
28		18,939	21,588	23,647	27,336	31,391	34,027	37,916	41,337	45,419	48,278
29		19,768	22,475	24,577	28,336	32,461	35,139	39,087	42,557	46,693	49,588
30		20,599	23,364	25,508	29,336	33,530	36,250	40,256	43,773	47,962	50,892

Pour $n > 30$, on peut admettre que $\sqrt{2\chi^2} - \sqrt{2n-1} \approx N(0,1)$